


# La lucha contra la avispa del castaño

## Situación actual de la plaga de la avispa del castaño

La plaga de la avispa se ha ido extendiendo por toda Europa tanto por dispersión natural como debido al transporte de planta contaminada. En la península Ibérica ya casi está en todas las zonas de castaños. En Castilla y León llegó al norte de Burgos en 2015 y a León llegó en 2017. En El Bierzo hay avispa del castaño en los municipios cercanos a Galicia y es de esperar que se vaya extendiendo sin remedio.



## La lucha contra la avispa del castaño

Hasta la fecha el único medio de control de la plaga de la avispa que ha dado unos resultados aceptables allí donde se ha utilizado ha sido la suelta masiva del parasitoide *Torymus sinensis*. Se está probando en Italia, Francia, Portugal y en España en Galicia y Andalucía.



*Torymus sinensis*

Desde que se suelta el parasitoide hasta que hace efecto el control pueden pasar entre 4 y 8 años, durante los cuales los daños por avispa del castaño pueden ser importantes.

Para que la suelta del parasitoide pueda tener éxito es imprescindible que el grado de plaga de avispa en la zona sea alto y requiere un estudio previo para adecuar el momento de la suelta.

## Suelta controlada con fines experimentales del parasitoide *Torymus sinensis* para estudiar la viabilidad de su empleo en la lucha contra la avispa del castaño

En estos momentos la suelta del parasitoide requiere de autorización previa y solo la puede realizar la administración. Durante el año 2018 se ensayará el uso del parasitoide *Torymus sinensis* en las zonas con fuerte afección de avispa del castaño y tras un estudio previo para adecuar el momento. **Con el fin de que se pueda establecer el parasito en la zona y comenzar el control de la plaga es muy importante que en los puntos de suelta del parasitoide se cumplan las siguientes normas:**

- ✓ **No se debería usar ningún tipo de insecticida en ningún momento del año para evitar la muerte de los *Torymus sinensis* y más sabiendo que los insecticidas no son efectivos contra la avispa del castaño. Sobre todo es fundamental no usar insecticidas durante la primavera que es cuando los *Torymus* adultos están volando por la zona.**
- ✓ **Desde el momento de la suelta del parasitoide (abril) y hasta mediados de noviembre no se realizará ninguna poda.**
- ✓ **Los restos de poda (tanto hojas como ramas) no se eliminarán hasta pasadas 2 primaveras después de la poda, con el fin de dar tiempo a la emergencia de todos los *Torymus* del interior de la agallas.**



Para más información dirigirse a los **AGENTES MEDIOAMBIENTALES** de la zona, **Of. Comarcal de Villafranca del Bierzo Tf: 987 542 409**, al **S.T. de Medio Ambiente de LEÓN Tf: 987 296 000** ó al **Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos. Tf: 979 770 403; [sanidad.forestal@jcy.l.es](mailto:sanidad.forestal@jcy.l.es).**

**TU COLABORACIÓN ES NECESARIA PARA CONSEGUIR  
FRENAR LOS GRAVES DAÑOS QUE CAUSA  
LA PLAGA DE LA AVISPILLA DEL CASTAÑO  
¡¡¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!!!**